

کد مستند:
GCC-PA-111-05



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

«بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان»

لیپوم (توده چربی)

تهیه کننده: نجمه مهرزاد

منبع: تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی

تاریخ تدوین: زمستان ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۲



- این گره‌ها فاقد علائمی نظیر خارش یا درد هستند.

- این عارضه ممکن است به صورت یک ضایعه منفرد یا ضایعات متعدد بروز کند.

درمان:

معمولاً لیپوم نیاز به درمان خاصی ندارد ولی اگر اندازه آن بزرگ شده باشد و منظره بدی را برای بیمار فراهم کرده باشد می‌توان از عمل جراحی استفاده کرد و آن را برداشت.

مراقبت های بعد از عمل:

برداشتن پانسمان ۴۸ ساعت بعد از عمل
کشیدن بخیه ها ۷ روز بعد از عمل
مراجعه به درمانگاه ۷ روز بعد از عمل
مصرف داروهای آنتی بیوتیک و مسکن طبق نظر جراح

لیپوم (توده چربی):

لیپوم به **تومور** خوش خیم با منشأ **بافت چربی** متراکم گفته می‌شود. این غده نسبتاً شایع در مناطق مختلف بدن تشکیل می‌شود. علائم آن اغلب ناشی از فشار بر بافتهای مجاور می‌باشد.

معمولاً در معاینه توده‌ای قابل حرکت و بدون درد لمس می‌شود. اغلب اندازه این غده کوچک است (بندرت به شش سانتیمتر می‌رسد). در بالغین بین چهل تا شصت سال شایعتر است اما در جوانترها و کودکان نیز ممکن است مشاهده شود.

علائم شایع لیپوم:

گره‌هایی در زیر پوست رشد می‌کنند که دارای ویژگی‌های زیر هستند:

- این گره‌ها گنبدی شکل و دارای قطر ۱۰-۲ سانتی‌متر هستند. امکان دارد بعضی اندازه‌های بزرگ‌تر هم پیدا کنند.

- این گره‌ها در هنگام لمس دارای شکل خمیری و سطح صاف بوده و به راحتی می‌توان آن‌ها را حرکت داد.

- پوست روی ضایعات دارای ظاهری طبیعی می‌باشد.