




به نام خالق هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

«بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان»

آنژیوگرافی



تهیه کننده: شهذخت شکیبا / سرپرستار بخش CCU

تایید کننده علمی: دکتر حسن کشمیری / متخصص قلب

وعروق

منبع: مراقبت های پرستاری ویژه

تاریخ تدوین: مهرماه ۹۸ تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۲



عوارض آنژیوگرافی:

این روش عموماً بی خطر می باشد اما می تواند به ندرت سبب عوارض زیر گردد:

- خونمردگی و خونریزی در محل کشاله ران
- نارسایی کلیوی
- ایجاد واکنش حساسیتی
- بی نظمی ضربان قلب

اگر خونریزی شدید در محل آنژیوگرافی، پیشرفت تورم و کبودی در محل آنژیو، تب بالای ۳۸ درجه و سردی، رنگ پریدگی و احساس کرختی و درد در محل آنژیو در بیمار ایجاد شود باید سریع به پزشک مراجعه کنید.

مراقبت های بعد از آنژیوگرافی:

*بیمار به مدت ۴ ساعت بعد از آنژیوگرافی باید ناشتا باشد.

*کیسه شن به مدت ۴ الی ۶ ساعت باید روی محل آنژیو گذاشته شود.

* پاهای خود را از ناحیه کشاله ران خم نکنید ولی ناحیه انگشتان و مچ پا را حرکت دهید. تا جریان خون بهتر انجام شود و از تشکیل لخته جلوگیری کند.

*۲۴-۴۸ ساعت بعد از عمل شما می توانید پانسمان محل عمل را برداشته و حمام کنید.

*از بلند کردن اجسام سنگین در چند روز اول پس از انجام آنژیوگرافی خودداری کنید.

*در صورتی که مجبور هستید مسافرت کنید از آویزان کردن پایی که آنژیو شده خودداری کنید.

سرخرگ های کرونری (رگ های خون دهنده ی قلب) ، خون و اکسیژن مورد نیاز عضله قلبی را تامین می کنند. ممکن است این سرخرگ ها متعاقب افزایش سن، تجمع کلسترول، یا سایر موارد دچار تنگی شوند. این امر سبب کاهش جریان خون به قلب شما می شود. آنژیوگرافی یک عمل تشخیصی است که به منظور مشخص شدن وضعیت رگ ها از نظر تنگی و یا گرفتگی آن ها انجام می گیرد.

چگونگی انجام آنژیوگرافی:

قبل از شروع آنژیوگرافی یک داروی آرامبخش ضعیف جهت کاهش اضطراب بیمار به وی داده می شود. معمولاً لوله آنژیوگرافی یا کاتتر، از یکی از شریان های اصلی بازویی یا رانی وارد عروق میشود.

محل ورود کاتتر در بازو یا ران با استفاده از یک ماده بیحسی، بیحس می شود.

متخصص قلب با استفاده از یک سوزن به شریان دسترسی می یابد، سپس کاتتر را وارد سرخرگ کرده و به آرامی آن را به سمت قلب هدایت میکند. که با استفاده از عکس های رادیولوژیک محل کاتتر مشخص می شود.

ماده رنگی حاجب، جهت واضحتر شدن عکسها به داخل لوله تزریق می شود.

آمادگی های لازم قبل از آنژیوگرافی:

*توجه داشته باشید که از ۸ ساعت قبل از عمل، نباید چیزی بخورید و بیاشامید.

*قبل از انجام آنژیوگرافی در صورتی که سابقه حساسیت (دارویی یا غذایی) دارید، باید به پزشک

و یا پرستار اطلاع دهید.

*قبل از رفتن به اتاق عمل مثانه خود را تخلیه کنید.

*اگرچه معمولاً عمل آنژیوگرافی بدون درد و ناراحتی انجام می شود، با این حال گاهی در هنگام تزریق ماده حاجب، احساس تهوع، استفراغ و یا گرمی بوجود می آید که سریعاً برطرف می شود.

* اگر بیمار داروهای قندخون ، فشارخون، چربی خون و ضدآنژین مصرف می کند، باید به پزشک اطلاع دهد.

*داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین از ۲۴ تا ۴۸ ساعت (بانظر پزشک) قبل از آنژیوگرافی باید قطع گردد.

*قبل از آنژیوگرافی، موهای محل ورود کاتتر آنژیوگرافی در قسمت کشاله ران و زیر بغل تراشیده شوند.