

کورتاژ:

کورتاژ در لغت به معنی تراشیدن و خارج کردن قسمتی از بافت بدن و اتساع و بیرون آوردن جنین یا بافت داخل رحم می باشد. در این روش دهانه ی رحم به وسیله ی ابزار قاشقی شکلی به نام کورت دیواره ی رحم را می تراشند.

انواع کورتاژ:

۱. کورتاژ ساده یا تراشنده (D & C)

۲. کورتاژ ساکشنی یا مکند

انواع کورتاژ در چه افرادی مجاز است:

۱. اگر در طی دوران بارداری نتایج آزمایشات غربالگری جنین دال بر وجود نقصی در جنین مانند تشکیل نشدن سر، کلیه ها، بیرون زدگی مغز از سر، ابتلا به تریزومی های ۱۳، ۱۸، ۲۱ و استقرار روده ها خارج از شکم باشد.
۲. قبل از هفته ۱۸ بارداری مجوز های لازم توسط پزشک قانونی برای انجام کورتاژ و سقط.

مراقبت های بعد از عمل کورتاژ:

۱. پس از گذشت چند ساعت می توان فعالیت های طبیعی روزمره خود را انجام دهید.
۲. وجود درد خفیف شکمی و خونریزی تا دو روز پس از کورتاژ طبیعی است.
۳. تا دو هفته پس از کورتاژ نزدیکی نکنید- پس از گذشت ۶ - ۲ هفته مجددا عادت ماهیانه شما آغاز می شود.

عوارض پس از عمل جراحی کورتاژ:

۱. عفونت های رحمی
۲. پاره شدن رحم
۳. آسیب دیدن روده ها
۴. چسبندگی رحم

کورتاژ تشخیصی چیست؟

خونریزی های داخلی رحمی که بر اثر داشتن پولیپ در دوران یائسگی رخ می دهد.

کورتاژ تشخیصی: خارج کردن محتویات رحم یا بقایای محتویات است و با هدف بررسی نمونه به دست آمده و تشخیص ضایعه در رحم انجام می شود.

در این مورد خونریزی ها پس از عادت ماهیانه به مدت ۲۰ روز می باشد و یا به صورت لکه بینی و خون ریزی زیاد مشاهده می شود که پس از انجام سونوگرافی و تشخیص توسط پزشک کورتاژ انجام می شود و سپس نمونه از مواد داخل رحمی جهت آزمایش پاتولوژی فرستاده و علت خونریزی مشخص می شود.

کورتاژ پس از سقط جنین: (کورتاژ درمانی)

مهم ترین علائمی که در هنگام سقط دیده می شود خون ریزی از رحم و درد است.

در شروع سقط جنین خون ریزی به صورت لکه بینی آغاز می شود و پس از مدت کمی زیاد می شود و لخته های بزرگ تشکیل می شود.

علت خون ریزی باقی ماندن کمی از جفت یا قسمتی از جنین درون رحم است و تا زمانی که این تکه ها خارج نشدند رحم جمع نمی شود و خون ریزی ادامه پیدا می کند.

کد مستند:
GCC-PA-102-05



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

«بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان»

کورتاژ

تهیه کننده: فاطمه علیزاده - کارشناس پرستاری

منبع: کتاب برونر سوادارت ۲۰۱۷

تاریخ تدوین: بهار ۱۳۹۸

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۲



مراقبت های پس از کورتاژ:

- بعضی خانم ها پس از چند ساعت فعالیت های طبیعی خود را از سر می گیرند و بعضی دیگر نیاز به چند روز استراحت دارند. دردهای کرامپی شکمی شایع هستند. اما معمولا بیشتر از ۲۴ ساعت طول نمی کشد. معمولا چند روز تا ۲ هفته کرامپ خون ریزی خفیف وجود دارد. توصیه می شود خانم ها تا ۲ هفته (یا تا زمانی که خون ریزی متوقف شود) نزدیکی نداشته باشند؛ معمولا ۲ تا ۶ هفته بعد از پرپود شروع می شود و بهتر است تا آن زمان از نوار بهداشتی استفاده نشود. مشخص نیست تخمک گذاری چه زمانی به وضعیت نرمال برمی گردد بنابراین توصیه می گردد در اولین نزدیکی سایر روش های مطمئن جلوگیری از بارداری تحت نظر پزشک استفاده شود.

علل سقط جنین:

۱. به وجود آمدن جنین از نطفه های ضعیف پدر یا مادر
۲. کم شدن هورمون های نگهدارنده
۳. اعمال جراحی روی رحم و دهانه آن مانند کورتاژ متعدد
۴. عفونت های مزمن مانند سل، سفلیس و کم خونی ها- اختلالات گروه خونی بین پدر و مادر
۵. شوک روحی- کارهای سنگین- نزدیکی زیاد در بارداری های پرخطر