

عفونت خون چیست؟

بوجود عفونت باکتریال در جریان خون گفته می شود که به ۲ نوع زود رس و دیر رس تقسیم می شود.

عفونت خون زود رس:

در هفته اول زندگی دیده می شود و اغلب در ۲۴ ساعت اول زندگی ظاهر می شود. عفونت اغلب از مادر گرفته می شود که ممکن است بوسیله باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول بارداری و زایمان زودرس عفونت جفت و پرده های اطراف آن ایجاد شود.

عفونت خون دیر رس:

بعد زایمان حاصل می شود. بوسیله تجهیزات آلوده در بیمارستان یا ماندن طولانی در بیمارستان ایجاد می شود.

نکته:

تغذیه با شیر مادر یک عامل محافظتی مفید در مقابل عفونت می باشد.

علائم بیماری:

- کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- تب ۳۸ درجه یا بالاتر
- تنفس غیر عادی
- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- خواب آلودگی و یا بی تفاوتی
- تغییر در تن صدای نوزاد و یا گریه های جیغ مانند و بیش از حد
- تغییر در تن عضلانی (سفتی یا شلی)
- کاهش یا افزایش ضربان قلب نسبت به حد طبیعی
- تورم یا برجستگی ملاحظه ها
- هر گونه تغییر رفتار یا حرکاتی که شما را نگران می کند.

نکته:

همه علائم و نشانه ها به این معنی نیست که فرزندتان مبتلا به عفونت خون است اما در نوزادان زیر ۳ ماه باید نوزاد توسط دکتر ویزیت شود تا مطمئن شویم که اشتباهی رخ نداده است.

ارزشیابی تشخیصی:

از آنجایی که عفونت خون به سادگی با سایر اختلالات نوزادی اشتباه می شود، تشخیص قطعی از طریق تست های آزمایشگاهی و رادیوگرافی می باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

«بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان»



تهیه کننده: ریحانه توسل کارشناس پرستاری

منبع: کتاب مراقبت های ویژه پرستاری نوزادان

تاریخ تدوین: بهار ۹۸

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۲



مادران عزیز چند نکته را باید رعایت کنند:

- شستن دست ها که مهم ترین و مؤثرترین روش کاهش عفونت های بیمارستانی است ، شستن دست قبل و بعد از تماس با نوزاد
- اجتناب از ازدحام در اتاق نوزادان
- مراقبت بسیار دقیق از پوست نوزاد
- تعویض مکرر کهنه های خیس

درمان:

نوزاد مبتلا به عفونت خون یا حتی موارد مشکوک به آن در بیمارستان جهت درمان بستری می شوند و با دیدن علائم عفونت نهفته پزشکان آنتی بیوتیک های قوی تزریقی را برای مقابله با عفونت در نوزاد شروع می کنند.

قطعاً پزشکان برای عفونت نوزادان آنتی بیوتیک درمانی را حتی قبل از تشخیص قطعی شروع می کنند.