

طبقه بندی دارویی: ضد آریتمی**اشکال دارویی:**

- قرص ۲۰۰ میلی گرم
- آمپول ۱۵۰ میلی گرم / ۳ میلی لیتر

موارد مصرف:

در درمان تاکی کاردی بطنی و غیر پایدار از نظر همودینامیکی و فیبریلاسیون بطنی زمانی که سایر داروها مؤثر نباشند مصرف می شود. این دارو از راه تزریقی جهت تخفیف و پیشگیری از آریتمی فوق بطنی و ۲ بطنی که به سایر داروها پاسخ نمی دهند ، به ویژه هنگامی که همراه با سندرم ولف پارکینسون وایت (W-P-W) باشد از جمله فیبریلاسیون دهلیزی ، فلومتر دهلیزی ، تاکی کاردی دهلیزی نابجا و تاکی کاردی فوق بطنی مصرف می شود.

این دارو در آریتمی بطنی مثل تاکی کاردی بطنی نیز مورد مصرف دارد.

فارموکوشیک:

جذب آمیودارون از راه خوراکی کند و متغیر است . حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از راه خوراکی جذب می شود سرعت دستیابی به غلظت پلاسمایی یکنواخت و درمانی دارو ، کند و دفع دارو طولانی است . متابولیسم این دارو کبدی است و نیمه عمر آن در مرحله ابتدایی ۲/۵ تا ۱۰ روز و در مرحله انتهایی ۲۶ تا ۱۰۷ روز است . اثر دارو ۲ تا ۳ روز تا ۲-۳ ماه پس از مصرف شروع می شود و حداکثر غلظت پلاسمایی نیز ۳ تا ۷ ساعت پس از مصرف حاصل می شود.

منع مصرف:

در انسداد دهلیزی -بطنی درجه ۲ یا ۳ که از قبل وجود داشته است (بدون ضربان ساز مصنوعی) حملات برادی کاردی که منجر به سنکوپ می شود در عیب عملکرد گروه سینوسی و حساسیت شدید به دارو نباید استفاده شود.

لازم به ذکر است که این عوارض ضرورتاً در همه افراد دیده نمی شود و در صورت توصیه به مصرف نباید از عوارض آن ترس داشت.

عوارض:

- ۱ . اختلال در بینایی
- ۲ . برادی کاردی (کاهش ضربان قلب)
- ۳ . حساسیت به نور و به ندرت تغییرات رنگ پوست
- ۴ . کم کاری تیروئید
- ۵ . پرکاری تیروئید
- ۶ . هپاتیت
- ۷ . تهوع و استفراغ
- ۸ . احساس طعم فلز در دهان
- ۹ . لرزش
- ۱۰ .
- ۱۱ . رگیجه و سردرد
- ۱۲ . ی خوابی
- ۱۳ . ثورات جلدی
- ۱۴ . التهاب عروق
- ۱۵ . اهنش پلاکت خون
- ۱۵ . نگی نفس

کد مستند:
GCC-PA-89-05



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

«بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان»

داروی آمیودارون را

بهتر بشناسیم

تهیه کننده: فاطمه علیزاده - کارشناس پرستاری

تاریخ تدوین: بهار ۱۳۹۸

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۲



۵

منبع:

- اینترنت
- داروهای ژنریک ایران

۴

هشدار:

۱. آزمون عملکرد کبد و تیروئید در درمان طولانی مدت ضروری است. آمیودارون می تواند سبب بروز اختلال در عملکرد تیروئید شود.
۲. در صورت بروز تنگی نفس یا پیشرفت آن و همچنین بروز سرفه در بیماری که آمیودارون مصرف می کند، احتمال وجود پنومونی باید در نظر گرفته شود.
۳. در موارد زیر با احتیاط مصرف شود:
 - نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه، بیماران سالخورده، برادی کاردی شدید
۴. بعلت کند بودن شروع اثر دارو، مشکل بودن تنظیم مقدار مصرف و احتمال بروز عوارض جانبی شدید درمان با این دارو در بیمارستان شروع شده و مقدار مصرف دارو برای هر بیمار باید جداگانه و بر اساس نیازهای بیمار پاسخ بالینی صورت پذیرد.
۵. در طول درمان با این دارو تعیین غلظت سرمی SGOT-SGPT (تست های کبدی) ثبت نوار قلب ضروری است.